



**İnkontinensia Pigmenti /
Incontinentia Pigmenti**
(sayfa / page: 351-357)

■ Güçlü Bir Ulusal Nöroloji Dergisi Öncelikli Hedeflerimizden Biri Olmalı! / A Powerful National Journal of Neurology Should Be One of Our Primary Missions!
Oğuz Tanrıdağ

■ Lökyozis Etiyopatogenezinin MR-Spektroskopi İle Değerlendirilmesi / The Evaluation of Leukoaraiosis Etiopathogenesis With MR-Spectroscopy
İlknur Aydın Cantürk, Nihal Işık, Fatma Candan ve ark.

■ Multipl Sklerozda Difüzyon Ağırlıklı Beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme / Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging of the Brain in Multiple Sclerosis
Murat Terzi, Köksal Atalay, Lütfi İncesu ve ark.

■ Karpal Tünel Sendromu Tanısında Ultrasonografinin Yeri ve Elektromiyografi İle Karşılaştırılması / Role of Ultrasonography in the Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome and Comparison With Electromyography
Abdullah Doğdaş, A. Oktay Işık, Cesur Gümüş ve ark.

■ Relapsing Remitting Multipl Sklerozda Serum Kolesterol Düzeyi İle Manyetik Rezonans Görüntüleme Aktivasyonunun Karşılaştırılması / Comparison of the Blood Cholesterol Levels With Magnetic Resonance Imaging Activity in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis
Zahide Yılmaz, Nihal Işık, Fatma Candan ve ark.

■ Serebellar Bilişsel Duygulanımsal Bozukluk / Cerebellar Cognitive Affective Syndrome
Feray Güleç, Serhan Işık, Çağdaş Eker, Süha Özaşkınlı

■ Psikiyatrik Bulguların Eşlik Ettiği İki Multipl Skleroz Olgusu / Two Cases of Multiple Sclerosis Accompanying Psychiatric Symptoms
Ayşegül Şengel, Abdurrahman Yurtarslan, Ufuk Ergün ve ark.

■ Spontan İntrakranyal Hipotansiyon Sendromuna Bağlı Abducens Paralizisi / The Abducens Nerve Palsy Due to Spontan Intracranial Hypotension Syndrome
Fazilet Hız, Turgut Karagöl, Tuğba Eyiipgil, S. Meral Çınar

■ İnkontinensia Pigmenti / Incontinentia Pigmenti
Gülçin Benbir, Cengiz Yalçinkaya

Daha sürekli uyarım¹ fazla hareket²



Stalevo[®]
(levodopa, karbidopa, entakapon) tablet
50/12.5/200 mg, 100/25/200 mg, 150/37.5/200 mg



Referanslar: 1. Silver DE, Clinical experience with the novel levodopa formulation entacapone + levodopa + carbidopa (Stalevo[®]). Expert Rev Neurotherapeutics 2004; 4(4), 558-559. 2. Rinne UK, et al and the Nomecomt Study Group. Entacapone enhances the response to levodopa in parkinsonian patients with motor fluctuations. Neurology 1998;51:1309-1314.

STALEVO[®]

Takdim Şekli: 3 ayrı dozaj şekli bulunmaktadır. Her bir film kaplı tablet 50 mg levodopa, 12.5 mg karbidopa ve 200 mg entakapon, 100 mg levodopa, 25 mg karbidopa ve 200 mg entakapon, 150 mg levodopa, 37.5 mg karbidopa ve 200 mg entakapon içerir. **Endikasyonları:** STALEVO, Parkinson hastalığı ve levodopa dozunun etkisinin geçmeye başladığı dönemlerde kötüleşme gözlenen hastaların tedavisinde endikedir. **Kullanım Şekli ve Dozu:** Halen STALEVO tablet dozuna eşit dozlarla standart salımlı levodopa/karbidopa ve entakapon ile tedavi edilen hastalarda özellikle STALEVO tablet kullanılabilir. Günlük STALEVO dozu, tercih edilen mevcut STALEVO tablet dozajlarından biri kullanılarak optimize edilmelidir. Önerilen maksimum günlük entakapon dozu 2000 mg'dır. Entakapon almayan bir hasta STALEVO tedavisine geçirildiğinde diğer anti-parkinson tedavilerinin dozlarının ayarlanması gerekebilir. **Kontraindikasyonları:** Aktif maddeler ya da formülasyonda bulunan katkı maddelerinden herhangi birine karşı bilinen bir hipersensitivite, şiddetli karaciğer bozukluğu, dar açılı glokom, feokromasitoma, selektif olmayan monoamino oksidaz (MAO-A ve MAO-B) inhibitörü, selektif bir MAO-A inhibitörü ve MAO-B inhibitörünün birlikte kullanımı, Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) ve/veya non-travmatik rabdomiyolitik öyküsü. **Uyarılar / Önlemler:** STALEVO tedavisi sırasında, levodopa içermesi nedeniyle, şiddetli kardiyovasküler ya da pulmoner hastalığı olan hastalarda, bronşiyal astımı olan hastalarda, renal, hepatic ya da endokrin hastalığı olan, kronik dar açılı glokom, peptik ülser hastalığı öyküsü ya da konvülsiyon öyküsü, miyokard infarktüsü öyküsü olan ya da ventriküler aritmisi bulunan, halen ya da geçmişte psikoza olan hastalarda, genel anestezi durumlarında, uzun süreli tedavide ya da tedaviye son verilirken dikkatli olunmalıdır. Mental değişiklikler, intihar eğilimleri olan depresyon ve diğer ciddi antisosyal davranışları geliştirme olasılığına karşı dikkatle izlenmelidir. STALEVO anneye sağlayacağı yararın fetus üzerinde oluşabilecek muhtemel risklerden daha üstün olmadığı sürece gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Araba ya da makina kullanırken oluşabilecek potansiyel uyku epizodlarına karşı dikkatli olunmalıdır. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. **İlaç Etkileşimleri:** Antihipertansif ilaçlarla levodopanın birlikte kullanımı semptomatik postüral hipotansiyona yol açabilir. Trişiklik antidepressanlarla veya noradrenalin gerilim inhibitörleriyle birlikte kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır. STALEVO, selegilin (selektif MAO-B inhibitörü) ile birlikte kullanılabilir fakat selegilin günlük dozu 10 mg'ı geçmemelidir. STALEVO, dopamin reseptör antagonistleri (örn. bazı antiipsikotikler ve antiemetikler), fenitoin ve papaverinle birlikte verildiğinde, levodopaya terapötik cevabın azalması açısından dikkatlice gözlemlenmelidir. Varfarin kullanan hastalara STALEVO başlanması düşünüldüğünde INR kontrolü tavsiye edilmektedir. STALEVO ve demir preparatları en az 2 ila 3 saat arayla alınmalıdır. STALEVO'nun absorpsiyonu, yüksek protein diyeti uygulayan bazı hastalarda zarar görebilir. **Yan Etkiler:** Hemolitik anemi, nöroleptik malign sendrom, agranülositoz, hepatit, malign melanom, aniden başlayan uyku epizotları, paranoid fikirler ve psikotik epizotlar dahil olmak üzere mental durum değişiklikleri, intihar eğilimli veya eğilimsiz depresyon, diskinezi, şiddetlenmiş parkinsonizm, baş dönmesi, distoni, hiperkinezi, uykusuzluk, halüsinasyonlar, konfüzyon, paroniri, duodenal ülser, gastrointestinal kanama, gastrointestinal semptomlar (örn. mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu), idrarda renk değişikliği, yorgunluk, terlemede artış, düşme. **Ruhsat Tarihi ve Numarası:** STALEVO 50/12.5/200 mg film kaplı 100 tablet 175,24 YTL (26.10.2006), STALEVO 100/25/200 mg film kaplı 100 tablet 175,24 YTL (26.10.2006), STALEVO 150/37.5/200mg film kaplı 100 tablet 199,60 YTL (04.09.2006). **Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):** STALEVO 50/12.5/200 mg film kaplı 100 tablet 175,24 YTL (26.10.2006), STALEVO 100/25/200 mg film kaplı 100 tablet 175,24 YTL (26.10.2006), STALEVO 150/37.5/200 mg film kaplı 100 tablet 199,60 YTL (04.09.2006). Reçete ile satılır. Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. NOVARTIS ÜRÜNLERİ Barbaros Bulvarı No: 83, 34349 Beşiktaş İstanbul, Tel: (0212) 326 91 00

Editör Editor

Oğuz Tanrıdağ, İstanbul
Memory Center Bağdat Caddesi
141/A 34724 Kadıköy, İstanbul
Tel: 90 216 418 15 00
oguztanridag@gmail.com

Önceki Editörler Previous Editors

Barış Baklan, İzmir
Kaynak Selekler, Ankara

Danışmanlar / Consultants

Genetik

A. Nazlı Başak, İstanbul

İstatistik

Öztaş Ayhan, Ankara

Nöropsikoloji

Öget Ö. Tanör, İstanbul

Türk Nöroloji Tarihi

Edip Aktin, İstanbul
Dursun Kırbaş, İstanbul

Editoryal Kurul Editorial Board

Ayşe Altıntaş, İstanbul	Zeki Odabaşı, Ankara	Ersin Tan, Ankara
Canan Aykut Bingöl, İstanbul	Ali Özeren, Adana	Hilmi Uysal, Antalya
Sara Bahar, İstanbul	Yakup Sarıca, Adana	Cengiz Yalçınkaya, İstanbul
Tülay Kansu, Ankara	Aksel Siva, İstanbul	

Uluslararası Danışma Kurulu International Advisory Board

Eva Andermann, Kanada	Jim Corbett, ABD	Marsel Mesulam, ABD
Frederick Andermann, Kanada	Andrew Eisen, ABD	Soheyl Noachtar, Almanya
Stanley Appel, ABD	Gerald M. Fenichel, ABD	Antony Reder, ABD
Valery Askanas, ABD	Marc Fisher, ABD	Benjamin Seltzer, ABD
Richard Barohn, ABD	Saran Jonas, ABD	Susan Spencer, ABD
Nathan Bornstein, İsrail	Howard S. Kirshner, ABD	Eduardo Tolosa, İspanya
David Burke, Avustralya	Andrew Lees, İngiltere	Brian Weinshenker, ABD
Stefano Cappa, İtalya	Ramon Leiguarda, Arjantin	Sandra Weintraub, ABD
Patricia S. Churchland, ABD	Facundo Manes, Arjantin	Benjamin Zipkin, Kanada

Yayın Danışma Kurulu / National Advisory Board 2007

Mustafa Bakar	İ. Hakan Gürvit	Kürşat Kutluk	Tülin Tanrıdağ
Betül Baykan	Haşmet Hanağası	A. Emre Öge	Önder Us
Bülent Elibol	Birsen İnce	Öget Öktem	Okay Vural
Gökhan Erkol	Hakan Kaynak	M. Zülküf Önal	Görsev Yener
Mustafa Ertaş	Barış Korkmaz	Mehmet Özmenoğlu	Ayşe Sağduyu Kocaman
Zeki Gökçil	Emre Kumral	Yeşim Parman	

Alzheimer hastalığında

etkinlik
öncelikse¹...

EXELON[®]
(Rivastigmin)

zaman kaybetmeden!

1. Bullock R et al. Rivastigmine and donepezil treatment in moderate to moderately-severe Alzheimer's disease over a 2-year period. Curr Med Res Opin. 2005 Aug;21(8):1317-27.

EXELON[®]:

Takdim şekli: 1.5 mg, 3.0 mg, 4.5 mg, 6.0 mg rivastigmin (hidrojen tartarat şeklinde) içeren kapsüller. Endikasyonları: Hafif-orta derecedeki Alzheimer tipi demans. Kullanım Şekli ve Dozu: Önerilen başlangıç dozu, günde 2 defa 1.5 mg'dir. Bu doz, en az 2 hafta devam eden bir tedaviden sonra, iyi tolere edilirse, günde 2 defa 3 mg, daha sonra günde 2 defa 4.5 mg, en fazla günde 2 defa 6 mg'a yükseltilebilir. Advers etkiler bir veya birkaç dozun alınmasına karşı çıkıyabilir. Advers etkiler devam ederse günlük doz iyi tolere edilinceye kadar önceki doza indirilmelidir. Kontrendikasyonları: Rivastigmin, diğer karbamat türevleri veya kapsülün diğer bileşenlerine karşı bilinen aşırı duyarlılık. Uyarılar/Önlemleri: Hasta sütü sendromu veya şiddetli kardiyak aritmiler, gastroduodenal ülseratif durumlara eğilimi, hastalar, üriner obstrüksiyon, kriz, sebelik ve emzirme. Etkileşimleri: Kolinomimetik ilaçlar, antikolinerjik ilaçlar. Yan Etkileri: Bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, iştah kaybı, dispepsi, yorgunluk, baş ağrısı. Ticari Şekli ve Fiyatı (KDV Dahil): Exelon 1.5 mg 28 kapsül, 78.71.-YTL (04.09.2006); Exelon 3.0 mg 28 kapsül, 78.71.-YTL (04.09.2006); Exelon 4.5 mg 28 kapsül, 78.71.-YTL (04.09.2006); Exelon 6.0 mg 28 kapsül, 78.71.-YTL (04.09.2006); Exelon 120 ml solüsyon 244.64.-YTL (04.09.2006). Reçete ile satılır. Ayrıntılı bilgi için prospektüse bakınız. Novartis Ürünleri İlaç, Sektörü Barbaros Bulvarı No:83, 80690 Beşiktaş, İstanbul, Tel: (0212) 259 72 00 (0212) 326 91 00 Faks: (0212) 236 56 59

P50008

İçindekiler / Contents

Editoryal Yapı / Editorial Structure	299
İçindekiler / Contents	301-302
Editörden / From the Editor	
Güçlü Bir Ulusal Nöroloji Dergisi Öncelikli Hedeflerimizden Biri Olmalı! / <i>A Powerful National Journal of Neurology Should Be One of Our Primary Missions!</i> Oğuz Tanrıdağ	303-304
Özgün Araştırma Yazıları / Original Research Articles	
Lökaryozis Etiyopatogenezinin MR-Spektroskopi İle Değerlendirilmesi / <i>The Evaluation of Leukoaraiosis Etiopathogenesis With MR-Spectroscopy</i> İlknur Aydın Cantürk, Nihal Işık, Fatma Candan, Tunahan Ayaz, Nüket Yıldız, Taner Seleker	305-309
Multipl Sklerozda Difüzyon Ağırlıklı Beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme / <i>Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging of the Brain in Multiple Sclerosis</i> Murat Terzi, Köksal Atalay, Lütfi İncesu, Barış Diren, Musa Onar	310-318
Karpal Tünel Sendromu Tanısında Ultrasonografinin Yeri ve Elektromiyografi İle Karşılaştırılması / <i>Role of Ultrasonography in the Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome and Comparison With Electromyography</i> Abdullah Doğdaş, A. Oktay Işık, Cesur Gümüş, Sema Bulut, Bilge Öztoprak, Suat Topaktaş	319-324
Relapsing Remitting Multipl Sklerozda Serum Kolesterol Düzeyi İle Manyetik Rezonans Görüntüleme Aktivasyonunun Karşılaştırılması / <i>Comparison of the Blood Cholesterol Levels With Magnetic Resonance Imaging Activity in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis</i> Zahide Yılmaz, Nihal Işık, Fatma Candan, İlknur Aydın Cantürk, Nüket Yıldız, Sebatije Erdoğan,	325-332
Özgün Olgu Sunumları / Original Case Reports	
Serebellar Bilişsel Duygulanımsal Bozukluk / <i>Cerebellar Cognitive Affective Syndrome</i> Feray Güleç, Serhan Işıklı, Çağdaş Eker, Süha Özaşkınlı	333-338

Yayın Bilgileri:

Türk Nöroloji Dergisi 2 ayda bir, yılda 6 kez yayınlanmaktadır.

Baskı:

Promat Matbaacılık A.Ş. Tel: 0212 690 63 63

Tasarım, Uygulama, Redaksiyon ve Baskı:



Tel: 0216 456 40 00 e-mail: info@pharmapublication.com

3P - Pharma Publication Planning, Mavi İletişim, Danışmanlık, Org. Tic. A.Ş.'nin medikal yayıncılık servsidir.

Psikiyatrik Bulguların Eşlik Ettiği İki Multipl Skleroz Olgusu / <i>Two Cases of Multiple Sclerosis Accompanying Psychiatric Symptoms</i> <i>Ayşegül Şengel, Abdurrahman Yurtarlan, Ufuk Ergün, Abidin Erdal, Serpil Vargel, Dilek Gürel Ertaş, Levent İnan</i>	339-344
Spontan İntrakranyal Hipotansiyon Sendromuna Bağlı Abdusens Paralizisi / <i>The Abducens Nerve Palsy Due to Spontan Intracranial Hypotension Syndrome</i> <i>Fazilet Hız, Turgut Karagöl, Tuğba Eyiipgil, S. Meral Çınar</i>	345-350
İnkontinensia Pigmenti / <i>Incontinentia Pigmenti</i> <i>Gülçin Benbir, Cengiz Yalçınkaya</i>	351-357
Sayı Sayı Dergi İstatistiği / Journal Statistics	358
Toplantı Duyuruları / Meetings, Seminars & Congresses	359-363
Türk Nöroloji Dergisi Temel Yayın Bildirgesi	364-366
Turkish Journal of Neurology Basic Publication Statement	367-369
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları	370-372
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and Information	373-375