



**Nörosarkoidoz ve Parsiyel Motor Nöbet /  
Neurosarcoidosis and Partial Motor Seizure**  
(sayfa / page: 273-275)

- Karotis Arterde Stenotik Plak Özellikleri İle İskemik Strok Rekürrensi Arasındaki İlişki / *Relationship Between Characteristics of Stenotic Plaque in Carotid Artery and Ischemic Stroke Recurrence*  
**Semai Bek, Şeref Demirkaya, Kemal Hamamcıoğlu ve ark.**
- Hemiplejinin Anozognozisi: İntrahemisferik Anatomi / *Anosognosia For Hemiplegia: Intrahemispheric Anatomy*  
**Ali Özeren, Hülya Mavi, Yakup Sarıca ve ark.**
- Erciyes Üniversitesi Nöroloji Polikliniğine Başvuran Yetişkin Epilepsi Hastalarının Sosyo-Demografik, Klinik Özellikleri ve Depresyonla İlişkisi / *The Socio-Demographic and Clinical Characteristics of the Adult Epileptic Patients Applying to the Neurology Clinic of Erciyes University and the Relation of These Phenomena to Depression*  
**Vesile Şenol, Ferhan Soyuer, Fehim Arman**
- Multipl Sklerozda Saplanıcı Tipte Baş Ağrısı, Atak Belirtici Olabilir mi? / *Could Stabbing Type of Headache in Multiple Sclerosis Be A Sign of MS Relapse?*  
**Gökhan Özer, Ufuk Ergün, Serap Üçler, Levent İnan**
- Nörosarkoidoz ve Parsiyel Motor Nöbet / *Neurosarcoidosis and Partial Motor Seizure*  
**Ayşegül Gündüz, Selim Gökdemir, Baki Göksan**
- Postpartum Dönemde Gelişen Posterior Reversibil Ensefalopati Sendromlu (PRES) Bir Olgu / *A Case of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) During the Postpartum Period*  
**Fatma Ece Bayam, Ayşe Sağduyu Kocaman**

# Daha sürekli uyarım<sup>1</sup> fazla hareket<sup>2</sup>



**Stalevo**<sup>®</sup>  
(levodopa, karbidopa, entakapon) tablet  
50/12.5/200 mg, 100/25/200 mg, 150/37.5/200 mg



**Referanslar:** 1. Silver DE, Clinical experience with the novel levodopa formulation entacapone + levodopa + carbidopa (Stalevo<sup>®</sup>). Expert Rev Neurotherapeutics 2004; 4(4), 558-559. 2. Rinne UK, et al and the Nomecomt Study Group. Entacapone enhances the response to levodopa in parkinsonian patients with motor fluctuations. Neurology 1998;51:1309-1314.

#### STALEVO<sup>®</sup>

**Takdim Şekli:** 3 ayrı dozaj şekli bulunmaktadır. Her bir film kaplı tablet 50 mg levodopa, 12.5 mg karbidopa ve 200 mg entakapon, 100 mg levodopa, 25 mg karbidopa ve 200 mg entakapon, 150 mg levodopa, 37.5 mg karbidopa ve 200 mg entakapon içerir. **Endikasyonları:** STALEVO, Parkinson hastalığı ve levodopa dozunun etkisinin geçmeye başladığı dönemlerde kötüleşme gözlenen hastaların tedavisinde endikedir. **Kullanım Şekli ve Dozu:** Halen STALEVO tablet dozuna eşit dozlarda standart salımlı levodopa/karbidopa ve entakapon ile tedavi edilen hastalarda özellikle STALEVO tablet kullanılabilir. Günlük STALEVO dozu, tercih edilen mevcut STALEVO tablet dozlarından biri kullanılarak optimize edilmelidir. Önerilen maksimum günlük entakapon dozu 2000 mg'dır. Entakapon almayan bir hasta STALEVO tedavisine geçirdiğinde diğer anti-parkinson tedavilerinin dozlarının ayarlanması gerekebilir. **Kontrendikasyonları:** Aktif maddeler ya da formülasyonda bulunan katkı maddelerinden herhangi birine karşı bilinen bir hipersensitivite, şiddetli karaciğer bozukluğu, dar açılı glokom, feokromasitoma, selektif olmayan monoamino oksidaz (MAO-A ve MAO-B) inhibitörü, selektif bir MAO-A inhibitörü ve MAO-B inhibitörünün birlikte kullanımı, Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) ve/veya non-travmatik rabdomiyoliz yükü. **Uyarılar / Önlemler:** STALEVO tedavisi sırasında, levodopa içermesi nedeniyle, şiddetli kardiyovasküler ya da pulmoner hastalığı olan hastalarda, bronşiyal astım olan, renal, hepatic ya da endokrin hastalığı olan, kronik dar açılı glokom, peptik ülser hastalığı yükü ya da konvülsiyon yükü, miyokard infarktüsü yükü olan ya da ventriküler aritmisi bulunan, halen ya da geçmişte psikoza olan hastalarda, genel anestezi durumlarında, uzun süreli tedavide ya da tedaviye son verilirken dikkatli olunmalıdır. Mental değişiklikler, intihar eğilimleri olan depresyon ve diğer ciddi antisosyal davranışları geliştirme olasılığına karşı dikkatle izlenmelidir. STALEVO anneye sağlayacağı yararın fetus üzerinde oluşabilecek muhtemel risklerden daha üstün olmadığı sürece gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Araba ya da makina kullanırken oluşabilecek potansiyel uyku epizodlarına karşı dikkatli olunmalıdır. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. **İlaç Etkileşimleri:** Antihipertansif ilaçlarla levodopanın birlikte kullanımı semptomatik postüral hipotansiyona yol açabilir. Trisiklik antidepressanlarla veya noradrenalin gerilim inhibitörleriyle birlikte kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır. STALEVO, selegilin (selektif MAO-B inhibitörü) ile birlikte kullanılabilir fakat selegilin günlük dozu 10 mg'ı geçmemelidir. STALEVO, dopamin reseptör antagonistleri (örn. bazı antipsikotikler ve antiemetikler), fenitoin ve papaverinle birlikte verildiğinde, levodopaya terapötik cevabın azalması açısından dikkatlice gözlemlenmelidir. Varfarin kullanan hastalara STALEVO başlanması düşünüldüğünde INR kontrolü tavsiye edilmektedir. STALEVO ve demir preparatları en az 2 ila 3 saat arayla alınmalıdır. STALEVO'nun absorpsiyonu, yüksek protein diyeti uygulayan bazı hastalarda zarar görebilir. **Yan Etkiler:** Hemolitik anemi, nöroleptik malign sendrom, agranülositoz, hepatit, malign melanom, aniden başlayan uyku epizotları, paranoid fikirler ve psikotik epizotlar dahil olmak üzere mental durum değişiklikleri, intihar eğilimi veya eğilimsiz depresyon, diskinezi, şiddetlenmiş parkinsonizm, baş dönmesi, distoni, hiperkinezi, uykusuzluk, halüsinasyonlar, konfüzyon, paroniri, duodenal ülser, gastrointestinal kanama, gastrointestinal semptomlar (örn. mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu), idrarda renk değişikliği, yorgunluk, terlemede artış, düşme. **Ruhsat Tarihi ve Numarası:** STALEVO 50/12.5/200 mg film kaplı 100 tablet 175,24 YTL (26.10.2006), STALEVO 100/25/200 mg film kaplı 100 tablet 175,24 YTL (26.10.2006), STALEVO 150/37.5/200mg 118-37/29.08.2005 **Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):** STALEVO 50/12.5/200 mg film kaplı 100 tablet 199,60 YTL (04.09.2006). Reçete ile satılır. Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. NOVARTIS ÜRÜNLERİ Barbaros Bulvarı No: 83, 34349 Beşiktaş İstanbul, Tel: (0212) 326 91 00

## Editör Editor

**Oğuz Tanrıdağ**, İstanbul  
Memory Center Bağdat Caddesi  
141/A 34724 Kadıköy, İstanbul  
Tel: 90 216 418 15 00  
[oguztanridag@gmail.com](mailto:oguztanridag@gmail.com)

## Önceki Editörler Previous Editors

Bariş Baklan, İzmir  
Kaynak Selekler, Ankara

## Danışmanlar / Consultants

### Genetik

A. Nazlı Başak, İstanbul

### İstatistik

Öztaş Ayhan, Ankara

### Nöropsikoloji

Öget Ö. Tanör, İstanbul

### Türk Nöroloji Tarihi

Edip Aktin, İstanbul

Dursun Kırbaş, İstanbul

## Editorial Kurul Editorial Board

Ayşe Altıntaş, İstanbul	Zeki Odabaşı, Ankara	Ersin Tan, Ankara
Canan Aykut Bingöl, İstanbul	Ali Özeren, Adana	Hilmi Uysal, Antalya
Sara Bahar, İstanbul	Yakup Sarıca, Adana	Cengiz Yalçınkaya, İstanbul
Tülay Kansu, Ankara	Aksel Siva, İstanbul	

## Uluslararası Danışma Kurulu International Advisory Board

Eva Andermann, Kanada	Jim Corbett, ABD	Marsel Mesulam, ABD
Frederick Andermann, Kanada	Andrew Eisen, ABD	Soheyl Noachtar, Almanya
Stanley Appel, ABD	Gerald M. Fenichel, ABD	Antony Reder, ABD
Valery Askanas, ABD	Marc Fisher, ABD	Benjamin Seltzer, ABD
Richard Barohn, ABD	Saran Jonas, ABD	Susan Spencer, ABD
Nathan Bornstein, İsrail	Howard S. Kirshner, ABD	Eduardo Tolosa, İspanya
David Burke, Avustralya	Andrew Lees, İngiltere	Brian Weinschenker, ABD
Stefano Cappa, İtalya	Ramon Leiguarda, Arjantin	Sandra Weintraub, ABD
Patricia S. Churchland, ABD	Facundo Manes, Arjantin	Benjamin Zipkin, Kanada

## Yayın Danışma Kurulu / National Advisory Board 2007

Mustafa Bakar	İ. Hakan Gürvit	Kürşat Kutluk	Tülin Tanrıdağ
Betül Baykan	Haşmet Hanağası	A. Emre Öge	Önder Us
Bülent Elibol	Birsen İnce	Öget Öktem	Okay Vural
Gökhan Erkol	Hakan Kaynak	M. Zülküf Önal	Görsev Yener
Mustafa Ertaş	Bariş Korkmaz	Mehmet Özmenoğlu	Ayşe Sağduyu Kocaman
Zeki Gökçil	Emre Kumral	Yeşim Parman	

Alzheimer hastalığında

etkinlik  
öncelikse<sup>1</sup>...

**EXELON**<sup>®</sup>  
(Rivastigmin)

zaman kaybetmeden!

1. Bullock R et al. Rivastigmine and donepezil treatment in moderate to moderately-severe Alzheimer's disease over a 2-year period. Curr Med Res Opin. 2005 Aug;21(8):1317-27.

EXELON<sup>®</sup>:

Takdim şekli: 1,5 mg, 3,0 mg, 4,5 mg, 6,0 mg rivastigmin (hidrojen tartarat şeklinde) çeren kapsüller. Endikasyonları: Hafif-orta derecedeki Alzheimer tipi demans. Kullanım Şekli ve Dozu: Önerilen başlangıç dozu günde 2 defa 1,5 mg'dır. Bu doz, en az 2 hafta devam eden bir tedaviden sonra, iyi tolere edilirse, günde 2 defa 3 mg, daha sonra günde 2 defa 4,5 mg, en fazla günde 2 defa 6 mg'a yükseltilebilir. Advers etkiler bir veya birkaç dozun alınmasına karşılık yanıt verir. Advers etkiler devam ederse günlük doz iyi tolere edilmiş bir öncelikli doza indirilmelidir. Kontrendikasyonları: Rivastigmin, diğer karbamat türevleri veya kapsülün diğer bileşenlerine karşı bilinen ağır duyarlılık. Uyarılar/Önlemler: Hasta sinüs sendromu veya şiddetli kardiyak aritmiler, gastroduodenal ülseratif durumlara eğilimli hastalar, üriner obstrüksiyon, kriz, zehbelik ve emzirme. Etkileşimler: Kolinomimetik ilaçlar, antikolinergik ilaçlar. Yan Etkiler: Bulantı, kusma, diyare, kânn ağrısı, iştah kaybı, dispepsi, yorgunluk, baş ağrısı. Ticari Şekli ve Fiyatı (KDV Dahil): Exelon 1,5 mg, 28 kapsül, 78,71.-YTL (04.09.2006); Exelon 3,0 mg, 28 kapsül, 78,71.-YTL (04.09.2006); Exelon 4,5 mg, 28 kapsül, 78,71.-YTL (04.09.2006); Exelon 6,0 mg, 28 kapsül, 78,71.-YTL (04.09.2006); Exelon 120 ml solüsyon 244,64.-YTL (04.09.2006). Reçete ile satılır. Ayrıntılı bilgi için prospektüse bakınız. Novartis Ürünleri İlaç, Sektörü Barbaros Bulvarı No:83, 80690 Beşiktaş, İstanbul. Tel: (0212) 259 72 00 (0212) 326 91 00 Faks: (0212) 236 56 59

## İçindekiler / Contents

<b>Editorial Yapı / Editorial Structure</b>	243
<b>İçindekiler / Contents</b>	245-246
<b>Özgün Araştırma Yazıları / Original Research Articles</b>	
Karotis Arterde Stenotik Plak Özellikleri İle İskemik Strok Rekürrensi Arasındaki İlişki / <i>Relationship Between Characteristics of Stenotic Plaque in Carotid Artery and Ischemic Stroke Recurrence</i> <b>Semai Bek, Şeref Demirkaya, Kemal Hamamcıoğlu, Oğuzhan Öz, Zeki Odabaşı, Okay Vural</b>	247-251
Hemiplejinin Anozognozisi: İntrahemisferik Anatomi / <i>Anosognosia For Hemiplegia: Intrahemispheric Anatomy</i> <b>Ali Özeren, Hülya Mavi, Yakup Sarıca, Nurcihan Kiriş, Fahri Över</b>	252-258
Erciyes Üniversitesi Nöroloji Polikliniğine Başvuran Yetişkin Epilepsi Hastalarının Sosyo-Demografik, Klinik Özellikleri ve Depresyonla İlişkisi / <i>The Socio-Demographic and Clinical Characteristics of the Adult Epileptic Patients Applying to the Neurology Clinic of Erciyes University and the Relation of These Phenomena to Depression</i> <b>Vesile Şenol, Ferhan Soyuer, Fehim Arman</b>	259-266
Multipl Sklerozda Saplanıcı Tipte Baş Ağrısı, Atak Belirteci Olabilir mi? / <i>Could Stabbing Type of Headache in Multiple Sclerosis Be A Sign of MS Relapse?</i> <b>Gökhan Özer, Ufuk Ergün, Serap Üçler, Levent İnan</b>	267-272
<b>Özgün Olgu Sunumları / Original Case Reports</b>	
Nörosarkoidoz ve Parsiyel Motor Nöbet / <i>Neurosarcoidosis and Partial Motor Seizure</i> <b>Ayşegül Gündüz, Selim Gökdemir, Baki Gökşan</b>	273-275
Postpartum Dönemde Gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromlu (PRES) Bir Olgu / <i>A Case of Posterior Reversibl Encephalopathy Syndrome (PRES) During the Postpartum Period</i> <b>Fatma Ece Bayam, Ayşe Sağduyu Kocaman</b>	276-281
<b>Sayı Sayı Dergi İstatistiği / Journal Statistics</b>	282
<b>Toplantı Duyuruları / Meetings, Seminars &amp; Congresses</b>	283-285

### Yayın Bilgileri:

Türk Nöroloji Dergisi 2 ayda bir, yılda 6 kez yayınlanmaktadır.

### Baskı:

Promat Matbaacılık A.Ş. Tel: 0212 690 63 63

### Tasarım, Uygulama, Redaksiyon ve Baskı:



3P-Pharma Publication Planning

Tel: 0216 456 40 00 e-mail: info@pharmapublication.com

3P-Pharma Publication Planning, Mavi İletişim, Danışmanlık, Org. Tic. A.Ş.'nin medikal yayıncılık servisedir.

<b>Türk Nöroloji Dergisi Temel Yayın Bildirgesi</b>	286-288
Turkish Journal of Neurology Basic Publication Statement	289-291
<b>Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları</b>	292-294
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and Information	295-297