



**Miyastenia Gravis Hastalarında HLA ile Asetil Kolin Reseptör Antikoru İlişkisi /
HLA and Acetylcholine Receptor Antibody Relationship in Myasthenia Gravis Patients**
(sayfa / page: 76-80)

- Türk Nöroloji Dergisi ULAKBİM Tıp Dizininde! / *Turkish Journal of Neurology is in the Medical Index of ULAKBİM (Turkish Academic Network and Information Center)!
Oğuz Tanrıdağ*
- Miyastenia Gravis Hastalarında HLA ile Asetil Kolin Reseptör Antikoru İlişkisi / *HLA and Acetylcholine Receptor Antibody Relationship in Myasthenia Gravis Patients
İrem Fatma Aşan, Ufuk Şener, Pınar Bekdik ve ark.*
- Parkinson Hastalığında Dopaminerjik Tedavinin Kontrast Duyarlılık, Görsel Uyarılmış Potansiyeller ve Görme Alanı Üzerine Etkisi / *Effects of Dopaminergic Treatment on Contrast Sensitivity, Visual Evoked Potentials and Visual Field in the Parkinson's Disease
Sabiha Türe, İpek İnci, Muhteşem Gedizlioğlu, Melih Türe*
- Gülhane Afazi Testi-2 (GAT-2)'nin Standardizasyon ve Geçerlik-Güvenirlilik Çalışması / *Standardization, Validity and Reliability Study of Gülhane Aphasia Test-2 (GAT-2)
İlknur Maviş, Kemal Colay, Seyhun Topbaş, Oğuz Tanrıdağ*
- Alzheimer Hastalığında Antioksidan Vitaminler / *Antioxidant Vitamins in Alzheimer's Disease
Özgür Ünal, Serhan Sevim, Erdal Çöl*
- Parkinson Hastalarında Hastalık Süresinin Yürüme Parametreleri Üzerine Etkisi / *Effect of Duration of Disease on Gait Parameters in Parkinson's Patients
Aygün Akbay Özşahin, Dilek İnce Günal, Hülya Demir ve ark.*
- Ağrılı Oftalmoplejiye Klinik Yaklaşım: Olgu Örnekleri Işığında Literatürün Gözden Geçirilmesi / *Clinical Approach to Painful Ophthalmoplegia: Literature Review in the Light of Case Examples
Derya Uludüz, Ayşegül Gündüz, Sait Albayram ve ark.*
- Kranial Paget Hastalığı: Olgu Sunumu / *Cranial Paget's Disease: A Case Report
Fazilet Hız, Turgut Karagöl, Meral Çınar ve ark.*
- Geç Başlangıçlı Bir Wilson Hastasında Polisomnografik Bulgular / *Polysomnographic Findings in A Late Onset Wilson's Disease Patient
Barış Metin, Melih Tütüncü, Derya Kaynak, Hakan Kaynak*
- Ender Bir Ensefalit Nedeni Olarak Lokal Varisella Zoster Enfeksiyonu / *Local Varicella Zoster Infection As A Rare Reason For Encephalitis
Fatma Ece Bayam, Ayşe Sağduyu Kocaman, Hadiye Şirin*
- Editöre Mektup / *Letter to the Editor
Dilaver Kaya*
- Editöre Mektup / *Letter to the Editor
Ebru Bilge Dirik, Canan Togay Işıkyay, Cenk Akbostancı ve ark.*

Alzheimer hastalığında

etkinlik
öncelikse¹...

EXELON[®]
(Rivastigmin)

zaman kaybetmeden!

1. Bullock R et al. Rivastigmine and donepezil treatment in moderate to moderately-severe Alzheimer's disease over a 2-year period. Curr Med Res Opin. 2005 Aug;21(8):1317-27.

EXELON[®]:

Takım şekli: 1,5 mg, 3,0 mg, 4,5 mg, 6,0 mg rivastigmin (hidrojen tartarat şeklinde) içeren kapsüller. **Endikasyonları:** Hafif-orta derecedeki Alzheimer tipi demans. **Kullanım Şekli ve Dozu:** Onenilen başlangıç dozu: günde 2 defa 1,5 mg'dir. Bu doz, en az 2 hafta devam eden bir tedaviden sonra, iyi tolere edilirse, günde 2 defa 3 mg, daha sonra günde 2 defa 4,5 mg, en fazla günde 2 defa 6 mg'a yükseltilebilir. Advers etkiler bir veya birkaç dozun alınmasına karşılık yavaş verir. Advers etkiler devam ederse günlük doz, iyi tolere edilmiş bir önceki doza indirilmelidir. **Kontrendikasyonları:** Rivastigmin, diğer karbamat türevleri veya kapsülün diğer bileşenlerine karşı bilinen ağır duyarlık. **Uyarıları/Önlemler:** Hasta sinüs sendromu veya şiddetli kardiyak aritmiler, gastroduodenal ülseratif durumlara eğilimli hastalar, üriner obstrüksiyon, kriz, gebelik ve emzirme. **Etkileşimler:** Kolinomimetik ilaçlar, antikolinerjik ilaçlar. **Yan Etkiler:** Bulantı, kusma, diyare, karn ağrısı, iştah kaybı, dispepsi, yorgunluk, baş ağrısı. **Ticari Şekli ve Fiyatı (KDV Dahil):** Exelon 1,5 mg, 28 kapsül, 78.71.-YTL (04.09.2006); Exelon 3,0 mg, 28 kapsül, 78.71.-YTL (04.09.2006); Exelon 4,5 mg, 28 kapsül, 78.71.-YTL (04.09.2006); Exelon 6,0 mg, 28 kapsül, 78.71.-YTL (04.09.2006); Exelon 120 ml solüsyon 244.64.-YTL (04.09.2006). Reçete ile satılır. Ayrıntılı bilgi için prospektüse bakınız. **Novartis Ürünleri İlaç, Sektörü Barbaros Bulvarı No:83, 80690 Beşiktaş, İstanbul. Tel: (0212) 259 72 00 (0212) 326 91 00 Faks: (0212) 236 56 59**

Editör
Editor

Oğuz Tanrıdağ, İstanbul
Memory Center Bağdat Caddesi
141/A 34724 Kadıköy, İstanbul
Tel: 90 216 418 15 00
oguztanridag@gmail.com

Önceki Editörler
Previous Editors

Bariş Baklan, İzmir
Kaynak Selekler, Ankara

Danışmanlar / Consultants

Genetik

A. Nazlı Başak, İstanbul

İstatistik

Öztaş Ayhan, Ankara

Nöropsikoloji

Öget Ö. Tanör, İstanbul

Türk Nöroloji Tarihi

Edip Aktin, İstanbul
Dursun Kırbaş, İstanbul

Editorial Kurul
Editorial Board

Ayşe Altıntaş, İstanbul	Zeki Odabaşı, Ankara	Ersin Tan, Ankara
Canan Aykut Bingöl, İstanbul	Ali Özeren, Adana	Hilmi Uysal, Antalya
Sara Bahar, İstanbul	Yakup Sarıca, Adana	Cengiz Yalçınkaya, İstanbul
Tülay Kansu, Ankara	Aksel Siva, İstanbul	

Uluslararası Danışma Kurulu
International Advisory Board

Eva Andermann, Kanada	Jim Corbett, ABD	Marsel Mesulam, ABD
Frederick Andermann, Kanada	Andrew Eisen, ABD	Soheyl Noachtar, Almanya
Stanley Appel, ABD	Gerald M. Fenichel, ABD	Antony Reder, ABD
Valery Askanas, ABD	Marc Fisher, ABD	Benjamin Seltzer, ABD
Richard Barohn, ABD	Saran Jonas, ABD	Susan Spencer, ABD
Nathan Bornstein, İsrail	Howard S. Kirshner, ABD	Eduardo Tolosa, İspanya
David Burke, Avustralya	Andrew Lees, İngiltere	Brian Weinschenker, ABD
Stefano Cappa, İtalya	Ramon Leiguarda, Arjantin	Sandra Weintraub, ABD
Patricia S. Churchland, ABD	Facundo Manes, Arjantin	Benjamin Zipkin, Kanada

Yayın Danışma Kurulu / National Advisory Board 2007

Mustafa Bakar	İ. Hakan Gürvit	Kürşat Kutluk	Tülin Tanrıdağ
Betül Baykan	Haşmet Hanağası	A. Emre Öge	Önder Us
Bülent Elibol	Birsene İnce	Öget Öktem	Okay Vural
Gökhan Erkol	Hakan Kaynak	M. Zülküf Önal	Görsev Yener
Mustafa Ertaş	Bariş Korkmaz	Mehmet Özmenoğlu	
Zeki Gökçil	Emre Kumral	Yeşim Parman	

Daha sürekli uyarım¹ fazla hareket²



Stalevo[®]
(levodopa, karbidopa, entakapon) tablet
50/12.5/200 mg, 100/25/200 mg, 150/37.5/200 mg



Referanslar: 1. Silver DE, Clinical experience with the novel levodopa formulation entacapone + levodopa + carbidopa (Stalevo[®]). Expert Rev Neurotherapeutics 2004; 4(4), 558-559 2. Rinne UK, et al and the Nomecomt Study Group. Entacapone enhances the response to levodopa in parkinsonian patients with motor fluctuations. Neurology 1998;51:1309-1314.

STALEVO[®]

Takdim Şekli: 3 ayrı dozaj şekli bulunmaktadır. Her bir film kaplı tablet 50 mg levodopa, 12.5 mg karbidopa ve 200 mg entakapon, 100 mg levodopa, 25 mg karbidopa ve 200 mg entakapon, 150 mg levodopa, 37.5 mg karbidopa ve 200 mg entakapon içerir. **Endikasyonları:** STALEVO, Parkinson hastalığı ve levodopa dozunun etkisinin geçmeye başladığı dönemlerde kötüleşme gözlenen hastaların tedavisinde endikedir. **Kullanım Şekli ve Dozu:** Halen STALEVO tablet dozuna eşit dozlarda standart salımlı levodopa/karbidopa ve entakapon ile tedavi edilen hastalarda özellikle STALEVO tablet kullanılabilir. Günlük STALEVO dozu, tercih edilen mevcut STALEVO tablet dozajlarından biri kullanılarak optimize edilmelidir. Önerilen maksimum günlük entakapon dozu 2000 mg'dir. Entakapon almayan bir hasta STALEVO tedavisine geçirildiğinde diğer anti-parkinson tedavilerinin dozlarının ayarlanması gerekebilir. **Kontrendikasyonları:** Aktif maddeler ya da formülasyonda bulunan katkı maddelerinden herhangi birine karşı bilinen bir hipersensitivite, şiddetli karaciğer bozukluğu, dar açılı glokom, feokromasitoma, selektif olmayan monoamino oksidaz (MAO-A ve MAO-B) inhibitörü, selektif bir MAO-A inhibitörü ve MAO-B inhibitörünün birlikte kullanımı, Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) ve/veya non-travmatik rabdomyoliz öyküsü. **Uyarılar / Önlemler:** STALEVO tedavisi sırasında, levodopa içermesi nedeniyle, şiddetli kardiyovasküler ya da pulmoner hastalığı olan hastalarda, bronşiyal astımı olan, renal, hepatik ya da endokrin hastalığı olan, kronik dar açılı glokom, peptik ülser hastalığı öyküsü ya da konvülsiyon öyküsü, miyokard infarktüsü öyküsü olan ya da ventriküler aritmisi bulunan, halen ya da geçmişte psikoza olan hastalarda, genel anestezi durumlarında, uzun süreli tedavide ya da tedavide son verilirken dikkatli olunmalıdır. Mental değişiklikler, intihar eğilimleri olan depresyon ve diğer ciddi antisosyal davranışları geliştirme olasılığına karşı dikkatle izlenmelidir. STALEVO anneye sağlayacağı yararın fetus üzerinde oluşabilecek muhtemel risklerden daha üstün olmadığı sürece gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Araba ya da makina kullanırken oluşabilecek potansiyel uyku epizodlarına karşı dikkatli olunmalıdır. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. **İlaç Etkileşimleri:** Antihipertansif ilaçlarla levodopanın birlikte kullanımı semptomatik postüral hipotansiyona yol açabilir. Trisiklik antidepresanlarla veya noradrenalin gerilim inhibitörleriyle birlikte kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır. STALEVO, seleğilin (selektif MAO-B inhibitörü) ile birlikte kullanılabilir fakat seleğilin günlük dozu 10 mg'ı geçmemelidir. STALEVO, dopamin reseptör antagonistleri (örn. bazı antipsikotikler ve antiemetikler), fenitoin ve papaverinle birlikte verildiğinde, levodopaya terapötik cevabın azalması açısından dikkatlice gözlemlenmelidir. Varfarin kullanan hastalara STALEVO başlanması düşünüldüğünde INR kontrolü tavsiye edilmektedir. STALEVO ve demir preparatları en az 2 ila 3 saat arayla alınmalıdır. STALEVO'nun absorpsiyonu, yüksek protein diyeti uygulayan bazı hastalarda zarar görebilir. **Yan Etkiler:** Hemolitik anemi, nöroleptik malign sendrom, agranülositoz, hepatit, malign melanom, aniden başlayan uyku epizotları, paranoid fikirler ve psikotik epizotlar dahil olmak üzere mental durum değişiklikleri, intihar eğilimi veya eğilimsiz depresyon, diskinezi, şiddetlenmiş parkinsonizm, baş dönmesi, distoni, hiperkinezi, uykusuzluk, halüsinasyonlar, konfüzyon, paroniri, duodenal ülser, gastrointestinal kanama, gastrointestinal semptomlar (örn. mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu), idrarda renk değişikliği, yorgunluk, terlemede artış, düşme. **Ruhsat Tarihi ve Numarası:** STALEVO 50/12.5/200 mg film kaplı 100 tablet 175,24 YTL (26.10.2006), STALEVO 100/25/200 mg film kaplı 100 tablet 175,24 YTL (26.10.2006), STALEVO 150/37.5/200mg film kaplı 100 tablet 199,60 YTL (04.09.2006). Reçete ile satılır. Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. NOVARTIS ÜRÜNLERİ Barbaros Bulvarı No: 83, 34349 Beşiktaş İstanbul, Tel: (0212) 326 91 00

İçindekiler / Contents

Editoryal Yapı / Editorial Structure	71
İçindekiler / Contents	73-74
Editörden / From the Editor	
Türk Nöroloji Dergisi ULAKBİM Tıp Dizininde! / <i>Turkish Journal of Neurology is in the Medical Index of ULAKBİM (Turkish Academic Network and Information Center)!</i> Oğuz Tanrıdağ	75
Özgün Araştırma Yazıları / Original Research Articles	
Miyastenia Gravis Hastalarında HLA ile Asetil Kolin Reseptör Antikoru İlişkisi / <i>HLA and Acetylcholine Receptor Antibody Relationship in Myasthenia Gravis Patients</i> İrem Fatma Aşan, Ufuk Şener, Pınar Bekdik, Işıl Çoker, Yaşar Zorlu	76-80
Parkinson Hastalığında Dopaminerjik Tedavinin Kontrast Duyarlılık, Görsel Uyarılmış Potansiyeller ve Görme Alanı Üzerine Etkisi / <i>Effects of Dopaminergic Treatment on Contrast Sensitivity, Visual Evoked Potentials and Visual Field in the Parkinson's Disease</i> Sabiha Türe, İpek İnci, Muhteşem Gedizlioğlu, Melih Türe	81-88
Gülhane Afazi Testi-2 (GAT-2)'nin Standardizasyon ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması / <i>Standardization, Validity and Reliability Study of Gülhane Aphasia Test-2 (GAT-2)</i> İlknur Maviş, Kemal Colay, Seyhun Topbaş, Oğuz Tanrıdağ	89-98
Alzheimer Hastalığında Antioksidan Vitaminler / <i>Antioxidant Vitamins in Alzheimer's Disease</i> Özgür Ünal, Serhan Sevim, Erdal Çöl	99-106
Parkinson Hastalarında Hastalık Süresinin Yürüme Parametreleri Üzerine Etkisi / <i>Effect of Duration of Disease on Gait Parameters in Parkinson's Patients</i> Aygün Akbay Özşahin, Dilek İnce Günal, Hülya Demir, Ayşe Akpınar, Ali Osman Üçkardeş, Önder Us	107-112
Özgün Olgu Serisi / Original Case Series	
Ağrılı Oftalmoplejiye Klinik Yaklaşım: Olgu Örnekleri Işığında Literatürün Gözden Geçirilmesi / <i>Clinical Approach to Painful Ophthalmoplegia: Literature Review in the Light of Case Examples</i> Derya Uludüz, Ayşegül Gündüz, Sait Albayram, Sabahattin Saip, Aksel Siva	113-121
Özgün Olgu Sunumları / Original Case Reports	
Kranial Paget Hastalığı: Olgu Sunumu / <i>Cranial Paget's Disease: A Case Report</i> Fazilet Hız, Turgut Karagöl, Meral Çınar, Tuğba Eyiipgil, Cansever Turgut, H. Ali Erdoğan	122-126

Yayın Bilgileri:

Türk Nöroloji Dergisi 2 ayda bir, yılda 6 kez yayınlanmaktadır.

Baskı:

Promat Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. 0212 456 63 63
www.promat.com.tr

Tasarım, Uygulama, Redaksiyon ve Baskı:



3P-Pharma Publication Planning

Tel: 0216 456 40 00 e-mail: info@pharmapublication.com
3P-Pharma Publication Planning, Mavi İletişim, Danışmanlık, Org. Tic. A.Ş.'nin medikal yayıncılık servisedir.

Geç Başlangıçlı Bir Wilson Hastasında Polisomnografik Bulgular / <i>Polysomnographic Findings in A Late Onset Wilson's Disease Patient</i> Barış Metin, Melih Tütüncü, Derya Kaynak, Hakan Kaynak	127-130
Ender Bir Ensefalit Nedeni Olarak Lokal Varisella Zoster Enfeksiyonu / <i>Local Varicella Zoster Infection As A Rare Reason For Encephalitis</i> Fatma Ece Bayam, Ayşe Sağduyu Kocaman, Hadiye Şirin	131-135
Editöre Mektup / Letter to the Editor Akut İnmeli Hastalarda Tedaviye Başlama Süresini Etkileyen Faktörler / <i>Factors Affecting the Latency from the Onset of Stroke to the Beginning of Treatment</i> Dilaver Kaya	136-138
Editöre Mektup / Letter to the Editor Ebru Bilge Dirik, Canan Togay Işıkay, Cenk Akbostancı, Bilge Gönenli, Nermin Mutluer	139-140
Sayı Sayı Dergi İstatistiği / Journal Statistics	141
Toplantı Duyuruları / Meetings, Seminars & Congresses	142-145
Türk Nöroloji Dergisi Temel Yayın Bildirgesi	146-148
Turkish Journal of Neurology Basic Publication Statement	149-151
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları	152-154
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and Information	155-157